




ที่ อบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๖๗

ผู้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ /องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี/  
เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากการควบคุมโรคว่า เนื่องจากสถานการณ์อาหาร เป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองประชาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วยจากการ กินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ พบรู้ป่วย จำนวน ๑๐๒ ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตอยู่ละ ๑๒.๗๕ ชี้นเข้าคุณภาพเพียงสองเดือนพบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงกว่าค่ามรณะ ๔ ปี ย้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งหมายความต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้ง เตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบเช่นเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงาน ท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐๘๔๖๗๑๖๔๔๕ (ประพรวนี ชารีกุล)



สตจ.อุบลราชธานี

รับเลขที่ ๑๙๔๖๙ งานที่ ๖.....

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖.....

เวลา.....

ที่ มท ๐๘๗๙.๓/ว ๓๓๒๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า เนื่องจากสถานการณ์  
อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด  
กองประชาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วย  
จากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ พบรู้ป่วย จำนวน ๑๐๒ ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๓๑ ราย  
คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๑๒.๗๕ ซึ่งเข้าคุณภาพเพียงสองเดือนพบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต  
สูงกว่าค่ามาตรฐาน ๕ ปีย้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  
ของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน  
การเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ และสามารถดาวน์โหลด  
ลิงก์ที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/3OPEGwP> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสารานุสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๖๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนารณ์ สองแก้ว

นายศักดิพัฒน์ อนุจันทร์

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/๔๔๗๙



กรมส่งเสริมการเกษตรห้องดิน  
เลขรับ..... 44389  
วันที่ - 4 ส.ค. 2566  
เวลา.....

กรมควบคุมโรค

ถนนติวนานท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

กองสาธารณสุขท่องเที่ยว

เลขรับ..... 2116

4 ส.ค. 2566

14.47

เวลา.....

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษวันที่  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

จำนวน ๓ แผ่น

เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  
ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบบวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖  
ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบรู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม ๑๐๒ ราย  
และผู้ป่วยเสียชีวิต ๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยติดต่ออย่างต่อเนื่อง ๑๒.๗๕% ซึ่งเข้าฤทธิ์ผิดเพียงสองเดือนพบผู้ป่วย  
และผู้เสียชีวิต สูงกว่าค่ามรณะ ๕ ปีย้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  
ของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ

กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ ท่าน แจ้งหน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน  
การเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ


ขอแสดงความนับถือ

( นายไกรณ เอี่ยมศิริถาวร )  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๑๘๗  
โทรสาร ๐ ๒๘๕๑ ๘๘๗๖

### ฤกุ忿 ระวัง “เห็ดพิษ” แม้กินเพียงนิด....เสี่ยงเสียชีวิตได้

ในช่วงฤกุ忿ของทุกปี เป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหอยชนิดตามธรรมชาติ ทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากโดยเฉพาะในระยะตูม การดูดawayตามาปล่าไม่สามารถแยกความเป็นพิษของเห็ดได้แน่นอน จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์คนจำนวนไม่น้อยเก็บเห็ดพิษหรือซื้อเห็ดรวมที่มีเห็ดพิษปะปนมากกิน จึงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยตั้งแต่เล็กน้อยจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากจากการกินเห็ดพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังกราฟ



#### สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษ

ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวภาระทาง กองระบบดิจิทัล กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ มีจำนวนผู้ป่วยรวม ๑๐๒ ราย ต่ำสุด ๑ ราย สูงสุด ๙ ราย (เฉลี่ย ๓.๗๖ ราย ค่ามัธยฐาน ๓ ราย) ผู้ป่วยเสียชีวิต รวม ๑๓ ราย (คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๑๒.๗๕) จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ระหว่าง ๑ - ๓ ราย ในแต่ละเหตุการณ์ผู้ป่วยมีอายุต่ำสุด ๕ ปี สูงสุด ๘๔ ปี (เฉลี่ย ๔๖ ปี ค่ามัธยฐาน ๔๗ ปี) และผู้ป่วยเสียชีวิตอายุต่ำสุด ๒๔ ปี สูงสุด ๘๑ ปี (เฉลี่ย ๕๕ ปี ค่ามัธยฐาน ๕๕ ปี) โดยเหตุการณ์แรกเกิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเริ่มมีฝนประปราย เมื่อเข้าสู่ฤกุ忿ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ปัจจุบัน พบรเหตุการณ์ระบาดเพิ่มสูงขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่าภาคอื่นๆ รายละเอียดดังตาราง

#### จำนวนเหตุการณ์ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษจำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัด	จำนวนเหตุการณ์	ผู้ป่วย	ผู้เสียชีวิต	อัตราป่วยตาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
อุบลราชธานี	๕	๕	๒	๔๐
เชียงราย	๓	๙	๓	๓๓
สกลนคร	๒	๖	๑	๑๗
บุรีรัมย์	๒	๙	๑	๑๗

จังหวัด	จำนวนเหตุการณ์	ผู้ป่วย	ผู้เสียชีวิต	อัตราป่วยตาย
มหาสารคาม	๓	๑๑	๑	๙
เลย	๒	๑๐	๕	๕
ชัยภูมิ	๑	๕	๐	๐
กาฬสินธุ์	๑	๓	๐	๐
รวม	๑๖	๔๗	๑๓	๒๓
ภาคใต้				
สงขลา	๑	๘	๐	๐
ตรัง	๑	๗	๐	๐
นราธิวาส	๑	๗	๐	๐
พัทลุง	๑	๓	๐	๐
ยะลา	๑	๒	๐	๐
รวม	๕	๒๗	๐	๐
ภาคตะวันออก				
สระแก้ว	๑	๖	๐	๐
ระยอง	๑	๓	๐	๐
รวม	๒	๙	๐	๐
ภาคกลาง				
สระบุรี	๑	๗	๐	๐
ภาคเหนือ				
เชียงราย	๑	๒	๐	๐
รวมทั้งประเทศ	๙	๑๐๙	๑๓	๑๒.๗๕

### ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

๑. การกินเห็ดป่าที่ไม่แน่ใจ หรือไม่รู้จักว่าเป็นเห็ดชนิดใด เนื่องจากเห็ดกินได้และเห็ดพิษหลายชนิด มีลักษณะเหมือนกันมากแยกจากกันได้ยากหากไม่มีความชำนาญ จากเหตุการณ์พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยเก็บเห็ด ด้วยตนเองจากป่าหรือสวนแควบ้านหรือพื้นที่ซึ่งเคยเก็บเห็ดมากกินเป็นประจำ (ร้อยละ ๗๓.๐๕) การเก็บเห็ด ในที่เดิมไม่ปลอดภัยเสมอไปเนื่องจากสปอร์ของเห็ดสามารถถลอกลงไปตกได้ใกล้จึงพับเห็ดพิษได้ทุกที่แม้ที่ยังไม่ เคยเกิดมานก่อน รองลงมาคือมีเพื่อนบ้านเก็บจากป่าแล้วนำมาแบ่งให้ (ร้อยละ ๑๕.๗๘) และซื้อจากตลาดหรือ เพื่อนบ้านเก็บมาขาย (ร้อยละ ๑๑.๔๔)

๒. การเก็บหรือซื้อเห็ดรวมโดยไม่มีการนำมาแยกอีกรังก่อนปรุงประกอบอาหาร (ร้อยละ ๖๕.๓๘) เห็ดหลายชนิดมีลักษณะคล้ายกันมากโดยเฉพาะในระยะต้น หากไม่พิจารณาให้ถ่องแท้หรือไม่มีความชำนาญ อาจมีเห็ดพิษປะปนมาด้วย

๓. การกินเห็ดร่วมกับเดี่มสุรา (ร้อยละ ๑๑.๔๔) เห็ดบางชนิดกินได้ เช่น เห็ดน้ำหมึก แต่เมื่อกินเห็ด ร่วมกับเดี่มสุรา จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ความดันโลหิตต่ำได้

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการหลังกินเห็ดมีตั้งแต่นานเป็นนาทีจนถึงหลายชั่วโมง โดยผู้ป่วยมีอาการ ตั้งแต่เล็กน้อย ได้แก่ วิงเวียน อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว จนถึงอาการรุนแรงได้away ตับวายและเสียชีวิต ในที่สุด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและลักษณะของเห็ดรวมถึงอาการแสดง

ของผู้ป่วย...

ของผู้ป่วย พบเห็ดที่มีพิษร้ายแรง ทำลายเซลล์ตับ ได้แก่ เห็ดระโกรกหินหรือเห็ดไข่ต่ายชา กซึ่งชาวบ้าน มักเข้าใจผิดว่าเป็นเห็ดใช่ทานหรือเห็ดระโกรกขาว เห็ดที่ทำลายระบบกล้ามเนื้อ ได้แก่ เห็ดถ่านเลือด ซึ่งมี รูปร่างลักษณะคล้ายเห็ดถ่านใหญ่มากแยกไม่ได้ด้วยรูปร่างลักษณะที่เห็นด้วยตา เห็ดถ่านเลือดมีพิษร้ายแรง ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงตายได้ เห็ดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ เห็ดหมากจีน และเห็ดทึกิน ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะมีผลต่อระบบประสาท เช่น เห็ดทึ่งห้อย เห็ดน้ำหมึก เป็นต้น

\*\*\*\*\* หากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว เป็นต้น ควรรีบไป สถานพยาบาลใกล้บ้านและนำตัวอย่างเห็ดที่เหลือหรือรูปถ่ายเห็ดไปสถาบันพยาบาลเพื่อประเมินชนิดของ พิษที่ได้รับ พร้อมแจ้งผู้รับประทานเห็ดร่วมกันให้สังเกตอาการและรีบไปสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจประเมินเช่นกัน

การป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ยึดหลัก “เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

๑. ไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้

๒. ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากกิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตุ่มที่มีรูปร่างคล้ายไข่อาจจะไม่สามารถ แยกเห็ดกินได้และเห็ดพิษออกจากรากนั้น เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกันมากจนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า

๓. ไม่กินเห็ดดิบโดยไม่ปรุงให้สุกก่อนกินทำให้เกิดพิษได้ เช่น เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น

๔. ไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดทึ่งห้อย เห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ

#### ความเชื่อผิดๆ ในการตรวจสอบเห็ดพิษ

การแยกเห็ดกินได้กับเห็ดพิษ บางคนมีความเชื่อว่า เมื่อนำเห็ดไปต้มรวมกับข้าวสารหรือห้อมแดง หากข้าวหรือห้อมแดงไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าเป็นเห็ดกินได้ หรือหากนำเครื่องเงินไปจุ่มน้ำห้มต้มเห็ดแล้ว เครื่องเงินไม่ดำแสดงว่ากินได้ หรือเห็ดที่มีรอยสัตว์กัดแทะเป็นเห็ดกินได้ เหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิด

#### การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แนวทางการปฐมพยาบาลที่บ้าน เมื่อกินเห็ดแล้วมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ควรปฏิบัติตัวดังนี้

๑. หากมั่นใจว่ากินเห็ดเพียงชนิดเดียวและมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยหลังจากกินเห็ดไม่เกิน ๕ ชั่วโมง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลวเพียงเล็กน้อย ไม่มีอาการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม ไม่แพ้ย ให้กิน ผงถ่านกันมันน์เพื่อตัดขับพิษและสังเกตอาการที่บ้าน ค่อยๆ จับน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไป หากเวลาผ่านไป ๑ ชั่วโมง ยังมีอาการมากขึ้นให้รีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน

๒. เน้นการรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อรับการประเมินและการดูแลรักษาเบื้องต้น

๓. ไม่แนะนำการกระตุนให้อาเจียน เนื่องจากจะทำให้เกิดความล่าช้าในการไปสถานพยาบาล และ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อจากการกินไข่ขาวดิบที่มีการปนเปื้อน เกิดบาดแผลในคอและช่องปากจากการล้วงคอ ด้วยนิ้วที่ไม่สะอาดหรือเล็บยาว ความดันต่ำหรือระดับเกลือแร่ผิดปกติจากการอาเจียนที่มากเกินไปเนื่องจาก พิษจากเห็ดทำให้อาเจียนมากอยู่แล้ว

๔. ลดการดูดซึมพิษเห็ดด้วยผงถ่านกันมันน์ ให้รักษาในปริมาณ ๕๐ กรัม สามารถกินได้เท่าที่มีและ ไม่ควรทำให้เสียเวลา อาจกินมะระห่วงเดินทางไปสถานพยาบาล